

XII.3.2. Propozycje ostoi „siedliskowych” według Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Realizacyjnego ds. Natura 2000 przesłane do Ministra Środowiska – nie zatwierdzone

Nazwa ostoi – propozycja WZR	Krótki opis i charakterystyka przyrodnicza obszaru	Przegląd gatunków kwalifikujących zwierząt i roślin wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC	Przegląd siedlisk kwalifikujących wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC
Dolina Dolnej Odry	Dolina Odry (z dwoma głównymi kanałami: Wsch. Odrą i Zach. Odrą) stanowi mozaikę obejmującą tereny podmokłe z torfowiskami i łąkami zalewanymi wiosną, lasami olszowymi i łęgowymi, starorzeczami, licznymi odnogami rzeki i wysepkami. Ostoja obejmuje również fragmenty strefy krawędziowej Doliny Odry z płacami roślinności sucholubnej w tym z murawami kserotermicznymi oraz lasami.	Bóbr europejski, mopek, nocek duży, nocek łydkowłosy, wydra, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, żółw błotny, boleń, brzanka, koza, łosoś atlantycki, różanka.	Starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, zalewane muliste brzegi rzek, suche, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>), grąd subatlantycki, dąbrowy acydofilne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe.
Dolina Piławy	Dolina rzeki Piławy na odcinku od jez. Busino Duże do ujścia do jeziora Pile z jez. Busino Duże, jez. Długie i Zalewami Nadarzyckimi, a także układy biocenotyczne otaczających ją równin sandrowych starszego i młodszego szlaku, usianych formami wytopiskowymi, w tym z wykształconymi w ich obrębie torfowiskami wysokimi.	Bóbr europejski, wydra, traszka grzebieniasta, koza, minóg strumieniowy, kreślinek, pływak szerokobrzegi, skójka gruboskorupowa.	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic, starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (dotyczy płatów stosunkowo bogatych florystycznie), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), torfowiska alkaliczne, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe.
Dolina Płytnicy	Dolina rzeki Płytnicy z jeziorem Przełęg i jeziorem Kniewo, a także układy biocenotyczne otaczających ją równin sandrowych starszego i w niewielkim stopniu młodszego szlaku, zwanego szlakiem Płytnicy. W oddziałach leśnych rozwinęły się fitocenozy przejściowo- i wysoko-torfowiskowe.	Bóbr europejski, wydra.	Wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi, górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (dotyczy płatów stosunkowo bogatych florystycznie), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, jaworzyny na stokach i zboczach, dąbrowy acydofilne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe.

Nazwa ostoi – propozycja WZR	Krótki opis i charakterystyka przyrodnicza obszaru	Przegląd gatunków kwalifikujących zwierząt i roślin wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC	Przegląd siedlisk kwalifikujących wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC
Dolina Radwi, Chotli i Chocieli	Dolina rzeki Radwi i jej największe dopływy (dolina Chotli i Chocieli). Obszar swoim zasięgiem obejmuje: – źródłiskowe dopływy jeziora Kwiecko – rzeka Łączna i Debrzyca – wraz z jeziorem Szczawno k. Zarzewia (obszar unikalnych mechowisk alkalicznych i torfowisk przejściowych, liczne zjawiska źródłiskowe z wytrącaniem się martwicy wapiennej, źródłiska wapienne), – jezioro Kwiecko z przyległymi torfowiskami i lasami na zboczach, – dolinę rzeki Radew w obrębie Pradoliny Pomorskiej, – jezioro Nicemino (jez. Rekowskie) i dopływ rzeki Mszanki, – dolinę Chocieli (obszar charakteryzuje się ogromną mozaiką cennych siedlisk, – dolinę rzeki Chotli (strome wąwozy i jary ze zbiorowiskami grądów i buczyn, ogromne nisze źródłiskowe ze zbiorowiskami wapniolubnych mchów i wątrobowców), – dolinę Radwi.	Nocek duży, podkowiec mały, wydra, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, głowacz białopłetwy, łosoś atlantycki, minóg rzeczny, minóg strumieniowy, piskorz, czerwonończyk nieparek, pachnica dębowa, przeplatka aurinia, przeplatka maturna, obuwik pospolity, skalnica torfowiskowa.	Jeziora lobeliowe, wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym, suche wrzosowiska, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, torfowiska alkaliczne, kwaśne buczyny, żyzne buczyny, ciepłolubne buczyny storczykowe, grąd subatlantycki, grąd środkowoeuropejski, dąbrowy acydofilne.
Drawski Park Krajobrazowy	Ostoja obejmuje najcenniejszy przyrodniczo i krajobrazowo fragment Pojezierza Drawskiego. Teren Drawskiego Parku Krajobrazowego (DPK). Na terenie ostoi zlokalizowanych jest 47 jezior (10% pow. terenu), reprezentujących większość typów jezior. Największą rzeką w Drawskim Parku Krajobrazowym jest Drawa.	Bóbr europejski, mopek, nocek duży, wydra, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, koza, minóg strumieniowy, piskorz, widłoząb zielony.	Jeziora lobeliowe, twarde wodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), torfowiska nakredowe, źródłiska wapienne.
Dziczy Las i Dolina Tywy	Dominującym typem siedlisk są lasy liściaste; największe powierzchnie zajmują dobrze wykształcone łągi olszowo-jesionowe i jesionowe, buczyny żyzne i kwaśne, olsy, grądy i kwaśne dąbrowy.	Bąk, bielik, błotniak stawowy, bocian biały, żuraw, wydra, kumak nizinny, kielb białopłetwy, koza.	Starorzeczka i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, suche, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>), górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe.